

**Combustin**® mit der Naturheilmarke  
Pharmazeutische Präparate GmbH **P**resselin®



Combustin pharmazeutische  
Präparate GmbH  
Offingerstr. 7  
88525 Hailtingen  
Tel: 07371 – 96 53 56  
Fax: 07371 – 96 53 58

Produktinformationen: Rufebran heparo Ampullen

PZN 10 Ampullen: 01085180

PZN 100 Ampullen: 01085205

**Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Besserung der Beschwerden bei Leberstörungen.

Bei Gelbsucht, Entfärbung des Stuhls und Gallensteinen sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

**Zusammensetzung:**

1 Ampulle zu 1 ml enthält: Wirkstoffe:

Carduus benedictus Dil. D6 0,25 ml

Carduus marianus Dil. D6 0,25 ml

Chelidonium Dil. D8 0,25 ml

Stannum metallicum Dil. D10 0,25 ml

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen parenteral 1-2 ml bis zu 3mal täglich subcutan injizieren. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen parenteral 1-2 ml täglich subcutan injizieren. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

**Gegenanzeigen:**

Überempfindlichkeit gegen Carduus marianus (Mariendistel), Carduus benedictus (Benediktinerdistel) oder andere Korbblütler.

Das Arzneimittel sollte wegen nicht ausreichender Untersuchungen nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit und auch nicht bei Kindern unter 12 Jahren angewendet werden.

**Nebenwirkungen:**

Keine bekannt.

In der Gebrauchsinformation wird auf Folgendes hingewiesen: "Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit".

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.